



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33

FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr

www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

DELFIN WG

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Εντομοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με εκλεκτική δράση κατά προνύμφες λεπιδοπτέρων. Δρα δια κατάποσης. Μετά την κατάποση οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Είναι βρέξιμοι κόκκοι (WG) με 85% β/β δραστική ουσία (Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Btk), strain SA-11), που ισοδυναμεί με $4,85 \times 10^{13}$ CFU/kg, 32000 IU/mg σε ενεργός πρωτεΐνη δ-endotoxin 6,4% και 15% β/β βοηθητικές ουσίες.

Κάτοχος της άδειας: MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.

Παρασκευαστής: CERTIS USA

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. Αριθμός εφαρμ./ ανά καλλ. Περίοδο Μεσοδιάστημ α εφαρμογών σε ημέρες
		Γραμ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Γραμ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά Μανταρινιά (Κλημεντίνες) Λεμονιά Γκρέιπ-φρουτ Κιτριά	Ανθοτρήτης (<i>Prays citri</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	25	50 - 100	200 -400	Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες.	2/ 7-10
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά Φυσικιά	Φυλλοδέτες (<i>Archips rosanus</i> , <i>A. podanus</i>) Φυλλοφάγες κάμπιες	25	37,5-62,5	150-250	Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφώνκάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6
	Υπονομευτές (<i>Hyponomeuta padellus</i> , <i>H. malinellus</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων				γεωργικές προειδοποιήσεις ή με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	εφαρμογές
Φουντουκιά	Φυλλοδέτες (<i>Archips rosanus</i> , <i>A. podanus</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	25	37,5-62,5	150-250	Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφώνκάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Μηλιά, Αχλαδιά	Φυλλοδέτες (<i>Archips podanus</i> , <i>A. rosanus</i> , <i>Pandemis heparana</i> ., <i>Argyrotaenia pulchellana</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	75	75	100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφώνκάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές



	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) Ζεύζερα (<i>Zeuzera pyrina</i>)	100	100		με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	
Βερικοκιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Κερασιά, Δαμασκηνιά	Φυλλοδέτες (<i>Archips podanus</i> , <i>A. rosanus</i>) Υπονομευτές (<i>Yponomeuta</i> <i>padellus</i> , <i>H.</i> <i>malinellus</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	75	75	100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προנוμφώνκάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
	Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i> , Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) Ζεύζερα (<i>Zeuzera pyrina</i>)	100	100			
Ελιά	-Πυρηνотρήτης (ανθόβια γενιά) (<i>Prays oleae</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	50 – 75	50 - 90	80 - 120	Οι ψεκασμοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6
					Εάν δεν υπάρχουν να διενεργηθούν οι ακόλουθοι ψεκασμοί: - όταν 5-25% των ανθέων έχουν ανοίξει. - μόλις εμφανιστούντα πρώτα ανοικτά άνθη. - μετά από 7-10 ημέρες εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων. Γενικά να γίνουν έως 6 ψεκασμοί ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό	εφαρμογές

Μπανάνα	<i>Chrysodeixis chalcites</i> Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>)	75 - 100	75 - 150	100 - 150	Να γίνουν ψεκασμοί μόλις εμφανιστούν οι νεογέννητες προνύμφες, έως 6 ψεκασμοί ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Αμπέλι	Ευδεμίδα, (<i>Lobesia botrana</i>) Κογχυλίδα, (<i>Eupoecilia ambiguella</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	50 - 75	50 - 75	100	Ψεκασμοί με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις της περιοχής οπότε συνιστάται ένας ψεκασμός μία εβδομάδα μετά την έναρξη πτήσης της κάθε γενιάς του εντόμου. Σε περίπτωση απουσίας γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών με βάση τα φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας και συγκεκριμένα: α) λίγο πριν την άνθιση β) κατά τη γονιμοποίηση των ανθέων γ) όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού δ) με την αλλαγή χρώματος των ραγών.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
					Γενικά, να γίνουν έως 6 ψεκασμοί ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	
Φράουλα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	--	75	100	Να γίνουν ψεκασμοί μόλις εμφανιστούν οι νεογέννητες προνύμφες, έως 6 ψεκασμοί ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές



					ψεκασμό.	
Τομάτα Πιπεριά, Μελιτζάνα Μπάμια (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodopetera spp</i>) Άλλα Noctuidae (<i>Chrysodeixis chalcites</i>) Μαμέστρα (<i>Mamestra spp.</i>) Πυραλίδα (<i>Ostrinia spp</i>) <i>Tuta absoluta</i> Άλλες κάμπιες (<i>Plutella maculipennis</i> , <i>Acrolepia assectella</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	--	75 -100	100	Να γίνουν ψεκασμοί μόλις εμφανιστούν οι νεογένητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Έως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Αγγούρι, Αγγουράκι Κολοκύθι Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodopetera spp.</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Πλούσια (<i>Plusia spp.</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	--	75 - 100	100	Να γίνουν ψεκασμοί μόλις εμφανιστούν οι νεογένητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Έως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Κουνουπίδι Μπρόκολο, Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών, κ.α.	Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodopetera spp.</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	--	75 - 100	100	Να γίνουν ψεκασμοί μόλις εμφανιστούν οι νεογένητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Έως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
	Πυραλίδα (<i>Ostrinia spp</i>)		100			



Μαρούλι κ.α. σαλατικά (σκαρόλα (πικρίδα), κάρδαμο, Φύλλα και βλαστοί του είδους brassica) Σπανάκι, Σέσκουλα, Άνηθο, Μάραθο, Αντίδι (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Μαμέστρα (<i>Mamestra</i> <i>brassicae</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodopetera</i> <i>littoralis</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i>) Άλλες κάμπιες (<i>Plutella</i> <i>maculipennis</i> , <i>Acrolepia</i> <i>assectella</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	--	75 - 100	20 - 100	Να γίνουν ψεκασμοίμόλις εμφανιστούν οι νεογέννητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Πράσο	Προνύμφες φυλλώματος (<i>Mamestra spp.</i> , <i>Plutella</i> <i>maculipennis</i> , <i>Acrolepia</i> <i>assectella</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	40 - 50	20 - 40	50 - 80	Να γίνουν ψεκασμοίμόλις εμφανιστούν οι νεογέννητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Αγκινάρα	Προνύμφες φυλλώματος (<i>Mamestra spp.</i> , <i>Plutella</i> <i>maculipennis</i> , <i>Acrolepia</i> <i>assectella</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	40 - 50	40 - 50	100	Να γίνουν ψεκασμοίμόλις εμφανιστούν οι νεογέννητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Γλυκό καλαμπόκι, Φασόλια Μπιζέλια (αρακάς)	Μαμέστρα (<i>Mamestra</i> <i>brassicae</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodopetera</i> <i>littoralis</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i>) Πιερίδα (<i>Pieris spp.</i>) Πυραλίδα (<i>Ostrinia spp</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	--	100 - 150	50 - 80	Να γίνουν ψεκασμοίμόλις εμφανιστούν οι νεογέννητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis</i> <i>armigera</i>) Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora</i> <i>gossypiella</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	30-50	15-40	50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφώνκάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή με τη χρήση φερομονικών	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές

					παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	
Καλαμπόκι	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>), Σεζάμια (<i>Sesamia nonagroides</i> , <i>S. cretica</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	40-50	20-50	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφώνκάθε γενεάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Καπνός	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	30-50	15-75	50-150	Να γίνουν ψεκασμοίμόλις εμφανιστούν οι νεογένητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Καλλωπιστικά φυτά Ανθοκομικά	Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες (<i>Mamestra spp.</i> , <i>Heliothis spp.</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i>) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων.	30-50	60-150	200-300	Να γίνουν ψεκασμοίμόλις εμφανιστούν οι νεογένητες προνύμφες, έως 6 ανά 7 ημέρες και να ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό.	Εως 6 συνεχόμενες εφαρμογές/ 7 Μέγιστο 6 εφαρμογές
Δασικά δένδρα Πεύκο, Βελανιδιά	Φυλλοφάγες προνύμφες: Πιτυοκάμπη (<i>Thaumatoroea pityocampa</i>)	25	75-125	300-500	Ψεκασμός φυλλώματος τον Σεπτέμβριο	3
	Λυμάντρια (<i>Lymantria dispar</i>)				Ψεκασμός φυλλώματος τον Απρίλιο/Μάιο	
	Υφάντρια (<i>Hyphantria cunea</i>) Μαλακόσωμα (<i>Malacosoma spp.</i>)				Ψεκασμός φυλλώματος τον Μάιο/Ιούνιο	
Αποθηκευμένα προϊόντα	Εφέστια (<i>Ephestia elutella</i>)	50	-	-	Ψεκασμός των εσωτερικών επιφανειών της	1

					αποθήκης	
--	--	--	--	--	----------	--

✓ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες (πρώτου και δεύτερου σταδίου) και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός
2. Οι εφαρμογές να γίνονται τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία
3. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί το σκεύασμα δρα δια κατάποσης.
4. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
5. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών από ψεκασμό, τότε ο ψεκασμός θα πρέπει να επαναληφθεί.

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος. Ειδικά για την ευδεμίδα και κογχυλίδα στο αμπέλι ο ψεκασμός γίνεται στην ζώνη των τσαμπιών.

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέτουμε το πυκνό διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα για πάνω από 12 ώρες.

✓ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις φορές με καθαρό νερό.

✓ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

✓ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.



- ✓ **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμηση τους. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης

- ✓ **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.	

- ✓ **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :**

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών

- ✓ **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**

Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό σε θερμοκρασία < 30 °C, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

- **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.**