



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

CALCIPHOS

ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL

Λίπασμα NP (CaO)(MgO) 5-39,3 (6,75)(0,6) + Zn + B.

✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Εγγυημένη σύνθεση	
Ολικό άζωτο (N)	5.50% β/β ή 9.00% β/ο
Νιτρικό άζωτο (N-NO ₃)	0.50% β/β ή 0.80% β/ο
Ουρικό άζωτο (N-NH ₂)	5.00% β/β ή 8.20% β/ο
Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅)	39.30% β/β ή 64.00% β/ο
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅), διαλυτό στο νερό	39.30% β/β ή 64.00% β/ο
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅), διαλυτό στο νερό και ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο	39.30% β/β ή 64.00% β/ο
Οξείδιο του ασβεστίου (CaO), διαλυτό στο νερό	6,75% β/β ή 11,00% β/ο
Οξείδιο του μαγνησίου (MgO), διαλυτό στο νερό	0,60% β/β ή 1,00% β/ο
Βόριο (B), ως βόριο αιθυνοαλαμίνης, διαλυτό στο νερό	0,11% β/β ή 0,18% β/ο
Ψευδάργυρος (Zn), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,34% β/β ή 0,56% β/ο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

Προϊόν: LIMA EUROPE NV

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος

Εφαρμογή Εδάφους:

Εφαρμόστε μεταξύ 0,3 -1 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή. Επαναλάβετε με βάση τις συστάσεις. Για συνεχές ριζοπότισμα, χρησιμοποιήστε 0,3 - 1,5 γρ./λίτρο. Η τυπική

σύσταση για τις περισσότερες συνθήκες καλλιέργειας είναι 1 γρ./λίτρο. νερού. **Πατάτα:** Εφαρμόστε 0,8 κιλά/στρέμμα στην κονδυλοποίηση και επαναλάβετε με την ίδια ποσότητα κατά την έναρξη της ανάπτυξης των κονδύλων και 10 ημέρες αργότερα. **Λαχανικά:** Εφαρμόστε 0,4-0,6 κιλά/στρέμμα μετά την μεταφύτευση ή τη βλάστηση μέχρι την εμφάνιση των πρώτων καρπών (για τις φράουλες). **Οπωροκηπευτικά δέντρα:** Εφαρμόστε 0,5-1 κιλά/στρέμμα την άνοιξη κατά την έναρξη της δραστηριότητας της ρίζας. Επαναλάβετε 10-15 ημέρες αργότερα.

Διαφυλλική Εφαρμογή:

Εφαρμόστε 0,2 – 0,5 κιλά/στρέμμα/εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε την συγκέντρωση 0,5% (5 γρ./λ. νερού). Χρησιμοποιείτε πάντα νερό σε επαρκή ποσότητα για να εξασφαλίσετε πλήρως την κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες ή σε περιόδους με υψηλή υδατική καταπόνηση για τα φυτά. Η καλύτερη περίοδος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ.

Μεγάλη καλλιέργεια (βαμβάκι, ζαχαρότευτλα δημητριακά κ.λπ.): Εφαρμόστε κατά το 4ο - 6ο φύλλο. Επαναλάβετε λίγο πριν το άρωμα (δημητριακά). **Πατάτα:** Εφαρμόστε κατά την κονδυλοποίηση. Επαναλάβετε κατά την έναρξη της ανάπτυξης των κονδύλων και 10 ημέρες αργότερα. **Λαχανικά:** Εφαρμόστε δύο φορές μετά την μεταφύτευση μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας. Επαναλάβετε κατά τη διάρκεια του σταδίου της καρπικής ανάπτυξης και κατά το σχηματισμό νέων ανθέων.

Οπωροκηπευτικά δέντρα: Εφαρμόστε πριν από το άνοιγμα των ανθών. Επαναλάβετε μετά την καρπόδεση, κατά την ανάπτυξη του καρπού και μετά τη συγκομιδή, πριν από την πτώση των φύλλων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ήμισυ του δοχείου ψεκασμού με καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα **Calciphos**, ολοκληρώστε γεμίζοντας πλήρως τη δεξαμενή με νερό και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε πρώτο το προϊόν στον ψεκαστήρα κατά την ανάμιξη με άλλα αγροχημικά. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες. Πάντα να διαβάσετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμιξη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

Το **GEL CALCIPHOS** είναι ένα φωσφορικό λίπασμα με υψηλή συγκέντρωση ασβεστίου, για χρήση διαφυλλικά και από εδάφους. Είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των πιο κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης των φυτών, όπου ο φώσφορος και το ασβέστιο είναι απαραίτητα. Παραδείγματα τέτοιων σταδίων είναι: η ριζοβολία, η κονδυλοποίηση, η άνθιση, ο σχηματισμός και η ωρίμανση καρπών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το **Calciphos** είναι συμβατό με την πλειονότητα των αγροχημικών και λιπασμάτων. Συνιστάται να εκτελέσετε μια δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. Αποφύγετε την ανάμιξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά, αναγωγικούς παράγοντες και θειικά. Πάντα να διαβάσετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν την ανάμιξη με το **Calciphos**. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.



ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύστε το μεταξύ 5 ° C και 50 ° C σε κατάλληλη αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε την αρχική συσκευασία μακριά από θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως. Η μερικώς χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** *Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.*