



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

FIVE MULTI GEL

ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL

ΛΙΠΑΣΜΑ N-P-K (CaO)(MgO) 13-13-13 (3,9)(2) με ιχνοστοιχεία.

✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Εγγυημένη σύνθεση	
Ολικό άζωτο (N)	13.20% β/β ή 20.00% β/ο
Νιτρικό Άζωτο (N-NO ₃)	6.80% β/β ή 10.30% β/ο
Ουρικό άζωτο (N-NH ₂)	6.40% β/β ή 9.70% β/ο
Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅)	13.20% β/β ή 20.00% β/ο
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅), διαλυτό στο νερό	13.20% β/β ή 20.00% β/ο
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅), διαλυτό στο νερό και ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο	13.20% β/β ή 20.00% β/ο
Οξείδιο του καλίου (K ₂ O), διαλυτό στο νερό	13.20% β/β ή 20.00% β/ο
Οξείδιο του ασβέστιο(CaO), διαλυτό στο νερό	3,90% β/β ή 6,00% β/ο
Οξείδιο του μαγνήσιο (MgO), διαλυτό στο νερό	2,00% β/β ή 3,00% β/ο
Βόριο (B), ως βορικό οξύ, διαλυτό στο νερό	0,010% β/β ή 0,016% β/ο
Χαλκός (Cu), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,002% β/β ή 0,003% β/ο
Σίδηρος (Fe), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,050% β/β ή 0,080% β/ο
Μαγγάνιο (Mn), χηλικό EDTA, διαλυτό στο νερό	0,023% β/β ή 0,037% β/ο
Μολυβδαίνιο (Mo), ως άλας νατρίου, διαλυτό στο νερό	0,002% β/β ή 0,003% β/ο
Ψευδάργυρος (Zn), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,010% β/β ή 0,016% β/ο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

Προϊόν: LIMA EUROPE NV

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος

Εφαρμογή εδάφους:

Εφαρμόστε 0,5 - 1 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή. Επαναλάβετε με βάση τις συστάσεις. Για συνεχές ριζοπότισμα, χρησιμοποιήστε 0,5 έως 2 γρ./λ. (0,05 έως 0,2%). Η τυπική σύσταση για τις περισσότερες συνθήκες καλλιέργειας είναι 1 γρ./λ νερού. **Πατάτα:** Εφαρμόστε 0,5 - 1 κιλό/στρέμμα κατά την βλαστική ανάπτυξη. Επαναλάβετε με 0,5 κιλά/στρέμμα στο στάδιο της διόγκωσης των κονδύλων. **Οπωροφόρα δέντρα:** Εφαρμόστε 0,7 - 1 κιλό/στρέμμα την άνοιξη, πριν την καρπόδεση. Επαναλάβετε στο στάδιο διόγκωσης του καρπού. **Λαχανικά (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, πεπόνι, φράουλες κ.λπ.):** Εφαρμόστε 0,7 - 1 κιλό/στρέμμα κατά την βλαστική ανάπτυξη.

Διαφυλλική εφαρμογή:

Εφαρμόστε 0,2 – 0,5 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συγκέντρωση 0,5% (5γρ./λίτρο). Χρησιμοποιείτε πάντα νερό σε επαρκή ποσότητα ώστε να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υδατική καταπόνηση των φυτών. Ο καλύτερος χρόνος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ. **Μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, κ.λπ.):** Εφαρμόστε κατά την καρπική ανάπτυξη. **Πατάτα:** Εφαρμόστε στο κλείσιμο της σειράς και στο στάδιο διόγκωσης των κονδύλων. **Οπωροφόρα δέντρα:** Εφαρμόστε μετά την καρπόδεση. Επαναλάβετε στα στάδια ανάπτυξης και διόγκωσης του καρπού. **Λαχανικά:** Εφαρμόστε κατά την βλαστική ανάπτυξη. Επαναλάβετε τις εφαρμογές μετά την καρπόδεση και κατά τη διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης και διόγκωσης των καρπών.

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το μισό δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα **Five Multi**, ολοκληρώστε γεμίζοντας πλήρως τη δεξαμενή με νερό και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε πρώτο το προϊόν κατά την ανάμιξη με άλλα αγροχημικά. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση. Πάντα να διαβάσετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμειξη με το FIVE MULTI. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία.

✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το **Five Multi** είναι συμβατό με την πλειονότητα των αγροχημικών και λιπασμάτων. Συνιστάται να εκτελέσετε μια δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. Αποφύγετε την ανάμιξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά, αναγωγικούς παράγοντες και θειικά. Πάντα να διαβάσετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμειξη με το **Five Multi**. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.

✓ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

Το **FIVE MULTI** συνδυάζει τα 5 πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για την αύξηση της παραγωγικότητας των φυτών σε ένα μόνο υδατοδιαλυτό προϊόν. Το **FIVE MULTI** είναι ένα ισορροπημένο λίπασμα N-P-K που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τα φυτά κατά τη βλαστική ανάπτυξη, κατά το στάδιο της ανάπτυξης και διόγκωσης του καρπού.

✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Προστατέψτε από τον παγετό, αποθήκευση μεταξύ 5 ° C και 50 ° C σε κατάλληλη αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία μακριά από θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως. Η μερικώς χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- *ΠΡΟΣΟΧΗ: Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.*