



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GEL STARTER

ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL

Λίπασμα N-P-K 10-42-10 με ιχνοστοιχεία.



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Εγγυημένη σύνθεση	
Ολικό άζωτο (N)	9.7% β/β ή 16.0% β/ο
Αμμωνιακό άζωτο (N-NO ₄)	2.50% β/β ή 4.10% β/ο
Ουρικό άζωτο (N-NH ₂)	7.2% β/β ή 11.9% β/ο
Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅)	42.00% β/β ή 69.0% β/ο
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό στο νερό	42.00% β/β ή 69.0% β/ο
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P ₂ O ₅) διαλυτό στο νερό και ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο	42.00% β/β ή 69.0% β/ο
Οξείδιο του καλίου (K ₂ O), διαλυτό στο νερό	9.70% β/β ή 16.0% β/ο
Βόριο (B), ως βορικό οξύ, διαλυτό στο νερό	0.010% β/β ή 0,016% β/ο
Χαλκός (Cu), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,002% β/β ή 0,003% β/ο
Σίδηρος (Fe), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,050% β/β ή 0,082% β/ο
Μαγγάνιο (Mn), χηλικό EDTA, διαλυτό στο νερό	0,025% β/β ή 0,041% β/ο
Μολυβδαίνιο (Mo), ως άλας νατρίου, διαλυτό στο νερό	0,002% β/β ή 0,003% β/ο
Ψευδάργυρος (Zn), χηλικός EDTA, διαλυτός στο νερό	0,010% β/β ή 0,016% β/ο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

Προϊόν: LIMA EUROPE NV

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος

Εφαρμογή εδάφους:

Εφαρμόστε 0,5-1 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή. Επαναλάβετε με βάση τις συστάσεις. Για συνεχές ριζοπότισμα, χρησιμοποιήστε 0,5 έως 2 γρ./λίτρο (0,05 έως 0,2%). Η συνήθης σύσταση για τις περισσότερες συνθήκες καλλιέργειας είναι 1 γρ./λίτρο νερού.

Πατάτα: Εφαρμόστε 0,5 - 1 κιλό/στρέμμα στην αρχή της κονδυλοποίησης. Επαναλάβετε με 0,5 κιλά/στρέμμα στην αρχή της ανάπτυξης των κονδύλων και 10 ημέρες αργότερα. **Οπωροφόρα δέντρα:** Εφαρμόστε 0,7-1 κιλό/στρέμμα την άνοιξη στην αρχή της ριζικής δραστηριότητας. Επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία και κατά το στάδιο της καρπόδεσης. Πραγματοποιήστε μία μετασυλλεκτική εφαρμογή με 1 κιλό/στρέμμα. **Λαχανικά:** Εφαρμόστε 0,7-1 κιλό/στρέμμα από το φύτευμα/μεταφύτευση μέχρι την έναρξη της άνθισης (ή τους πρώτους καρπούς για την φράουλα).

Διαφυλλική Εφαρμογή:

Εφαρμόστε 0,2–0,5 κιλά/στρέμμα/εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συγκέντρωση 0,5% (5γρ./λίτρο νερού). Χρησιμοποιείτε πάντα νερό σε επαρκή ποσότητα, ώστε να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία ή περιόδους με υψηλή υδατική καταπόνηση των φυτών. Ο καλύτερος χρόνος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ.

Μεγάλη καλλιέργεια: Εφαρμόστε στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων. Επαναλάβετε πριν ξεκινήσει η βλαστική ανάπτυξη. **Πατάτα:** Εφαρμόστε στο στάδιο της κονδυλοποίησης. Επαναλάβετε κατά την έναρξη της ανάπτυξης του κονδύλου και 10 ημέρες αργότερα. **Οπωροφόρα δέντρα:** Εφαρμόστε πριν το άνοιγμα των ανθέων. Επαναλάβετε μετά τη συγκομιδή, πριν πέσουν τα φύλλα. **Λαχανικά:** Πραγματοποιήστε 1-2 εφαρμογές από τη μεταφύτευση μέχρι την εμφάνιση των πρώτων ανθέων. Επαναλάβετε κατά τη δημιουργία νέων ανθέων.

✓ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

Το **GEL STARTER** είναι ένα σκεύασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο για τα στάδια ανάπτυξης, όπου η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας φωσφόρου είναι κρίσιμη, όπως είναι η μεταφύτευση, η ριζική ανάπτυξη, η άνθιση και η καρπόδεση.

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Γεμίστε το μισό από το δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα GEL STARTER, ολοκληρώστε γεμίζοντας πλήρως το δοχείο με νερό και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε πρώτο το προϊόν, κατά την ανάμιξη με άλλα αγροχημικά προϊόντα. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία. Πάντα να διαβάσετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμειξη.

✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το GEL STARTER είναι συμβατό με την πλειονότητα των αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται. Συνιστάται να εκτελέσετε μια δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. Αποφύγετε την ανάμιξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά, αναγωγικούς παράγοντες. Πάντα να διαβάσετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμειξη με το GEL STARTER. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.

✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύστε μεταξύ 5°C και 50°C σε κατάλληλη αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία. Η μερικώς χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- *ΠΡΟΣΟΧΗ: Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.*