

Πεδίο εφαρμογής:Στάγος-Δάσος-Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά): Για Κοκκοειδή, Λακίνα, Κάκκη ψώρα και άλλα Κοκκοειδή με 35-75 κκα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 112,5 κκα. (max) σε 100-225 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1^{ης} γενιάς με την έναρξη της καρποδότησης έως την ωρίμανση του καρπού (BBCH 71-89).

Μηλιά, Αχλαδιά, Βερκοειδή: Για Κοκκοειδή με 30 κκα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κκα. (max) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1^{ης} γενιάς, από την έκπτυξη των φύλλων μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 09-59).

Ροδιανά, Νεκταρινιά: Για Κοκκοειδή με 30 κκα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 24-30 κκα. (max) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1^{ης} γενιάς, από την έκπτυξη των φύλλων μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 09-59).

Ελιά: Για Λακίνα με 30 κκα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 37,5 κκα. (max) σε 100-125 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1^{ης} γενιάς, από την έκπτυξη των φύλλων μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 09-59).

Τομάτα (Θερμοκηπίου), Αγγούρι (Θερμοκηπίου): Για Αλευρώδεις με 75 κκα/100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-112,5 κκα. (max) σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί 10 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων ακαριών, από την έκπτυξη της ποδάρας έως την ωρίμανση του καρπού (BBCH 50-69).

Βαμβάκι: Για Αλευρώδη με 50 κκα. (max) σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 ψεκασμός με την εμφάνιση της ποδάρας πριν το σπείρισμα των καρπιδίων (BBCH 78-79).

Παρατηρήσεις: 1) Η χρήση στη Ροδιανά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά. 2) Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακαριών αλευρώδων είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακαριστικού ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του HARPUN. 3) Στην ελιά εμφανίζει δυσχερούσα δράση κατά της *Paratetranych oleae*.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποφευχθεί: Το σκεύασμα περιέχει ρητινοποίηση, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 7C κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείστε αυτό ή αποδιώχνετε άλλα σκεύασμα που περιέχει δια. ρητινοποίηση σε εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα διασποράς ομάδας και με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρόνος διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογών και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργητική στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του HARPUN στο ψεκαστικό δοχείο αναδίδοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναμειγνύοντας την ανάδραση.

Καθαρσιμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή του HARPUN αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα και το βύλι. Επιδιώξτε σχολαστικά το βύλι και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αραιωμένο όλα τα ορατά υπολείμματα. Επιδιώξτε τη διαδικασία με καθαρό νερό δύο (2) φορές.

Συνδυαστικότητα:-

Στοιχεία φυτοφονικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοφονικό στις συσσωσμένες καλλιέργειες και δάσος εφαρμογής στις Ελληνικές εξαγωγικές συνθήκες.

Τελευταία επίθεση πριν τη συγκομιδή ή την τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυνθετικές χρήσεις: Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμόνια, Μανταρινιά): 28 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδιανά/Νεκταρινιά, Βερκοειδή, Ελιά: Καθαρίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (πριν την άνθηση). Βαμβάκι: Μη εφαρμογής. Τομάτα (Θ): 3 ημέρες. Αγγούρι (Θ): 14 ημέρες.

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

HARPUN®

Εντομοκτόνο, Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)
Ρητινοποίηση (Πυριπροξυφέν)

UFI: HPRX-PAV8-F301-8J9R

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Ρητινοποίηση 10% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 88,9 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14640/23-02-2018

Το HARPUN είναι εντομοκτόνο, ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων για τον έλεγχο μυζητικών εντόμων. Μιμητικό της ορμόνης νεότητος των εντόμων, επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμφάνιση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους κατά την εφαρμογή (ωό, προνυμφική, νύμφη, ακαρία) παρεμποδίζοντας την ολολήρωση και ευημερία τους. Το HARPUN δρα σε όλα τα στάδια των εντόμων, είτε άμεσα (ωοκτόνο δράση) είτε έμμεσα αποτρέποντας το σχηματισμό ενηλίκων εντόμων κατά την εφαρμογή του στα προνυμφικά στάδια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική βλάβη σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Αποφύγετε να αναπνεύσετε σταγονίδια, ατμούς, εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την αναμείξη/φόρτωση». «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή στις καλλιέργειες ούλων». «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και γάντια κατά την εφαρμογή στις καλλιέργειες του θερμοκηπίου». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια». • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ακρόαση. • Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας: Galenika-Fitofarmacija d.o.o.
Trzaska cesta 515 I SL-1351
Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία

Παρασκευαστής σκευάσματος: Galenika-Fitofarmacija a.d.

Batajnici drum bb, Βελιγράδι - Σερβία



GALENIKA - FITOFARMACIJA

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επιδιώξτε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να επιδιώξετε. Κλείστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΗΘΡΑΣΕΩΝ/ΥΓΡΟ. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στην καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε οσάση που διασφαλίζει την αναπνοή. Κλείστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΗΘΡΑΣΕΩΝ/ΥΓΡΟ εάν αισθανθεί αδυναμία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Κλείστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΗΘΡΑΣΕΩΝ/ΥΓΡΟ. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Επιδιώξτε με καθαρό νερό και σαπούνι. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΗΘΡΑΣΕΩΝ: 210-7793777

- Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης, από τις λειοδότησεις επιφανείας και τους δρόμους).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφαιρέσει μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50% για την καλλιέργεια του βαμβάκιου.
- να αφαιρέσει μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90% για την καλλιέργεια της ελιάς.
- να αφαιρέσει μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 95% για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.
- να αφαιρέσει μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της ροδιανιάς, της νεκταρινιάς και της βερκοειδούς.
- να αφαιρέσει μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 70% σε καλλιέργειες θερμοκηπίου μη μόνιμης καλλιέργειας.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυνα μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζώων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή κλείστε τις κυψέλες των βομβών πριν την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το κενό μέσο συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένα (τα νερά του ελαστικού πλύνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Φυλάσσεται στην αρχική αποθήκευσή του, σε μέρος ξηρό, δροσερό, προστατευμένο από τον παγετό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ.
ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΛΗΞ.:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



FARMA-CHEM SA

Υπευθύνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@famachem.gr - www.famachem.gr