

LAMBDA STAR

2,5 WG

Αριθμός Άδειας Διανοχής στην Αγορά

(ΑΑΔΑ): 14406/15.10.2012

Εγγυημένη Σύμβαση: Δραστητική ουσία

Lambda-cyhalothrin: 2,5 % (B/B)

Βοηθητικές ουσίες: 97,4 % (B/B)

Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι WG

Lambda-cyhalothrin
(Λαμντα-κυαλοθρίν) 2,5%

Χρησιμοποιείται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες

ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ, ευρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και διά στομαχίου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μαρσιτικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευροδόντες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φυλάσσετε το Κλειδωμένο. • Για να αποφευχθεί το κούνημα των ενόχλων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Μην παυίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του (μην καθαρίζετε τα φεκατωτικά κατάλοιπα σε επιφανειακά υδρόαπορροφείς ρυτίτσες μέσω αποχετευτικών από αλές και δρόμων). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυμέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυμέλες ή να απομακρυνθούν οι κυμέλες. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέσκιση ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά υδρά για τις δενδροειδείς καλλιέργειες, 20 μέτρων για τις πατάτες. • Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέσκιση ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη για τις δενδροειδείς καλλιέργειες, και 5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες πριν την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Αποκαταστήστε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

400 γραμμ.



H **FARMA-CHEM SA** εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001

Μέλος του:



Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Europe B.V.B.A., Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Μταφοράς 5 11526, Αθήνα Τηλ.: 210 692132

Εργαστήριο συσκευασίας του σκευάσματος - Διανομέας:

FARMA-CHEM SA

Β.Π.Ε. ΣΙΝΔΩΔ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.407

info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: • Εάν χησιμοποιήσετε χημική ουσία, να έχετε μαζί σας τον περιεχτή του προϊόντος ή την ετικέτα. • Σε ΠΕΡΙΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιασθένεια. • Σε περίπτωση που έφαγαν το σκεύασμα: • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξαπλώστε αμέσως το μέρος που έφαγαν το σκεύασμα. Ξαπλώστε καλά με νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση εισπνοής: Ξαπλώστε τον πάτονα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε απόσταση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματολογική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Πεδίο εφαρμογής: Στάχυς-Δάσες-Χρήνος & Τρόπος εφαρμογής: Ροδονκινά-Νεκταρίνα: Πράσινη αφίδα (*Myzus persicae*). Μύκη μεσογειακή (*Carulias capitata*) με 40 γρ./100 λίτρα χημ. υγρού ή 40-60 γρ. σκευ. σε 100-150 λίτρα χημ. υγρού/στρέμμα. Ψεκάριο φύλλωματος με την εμφάνιση της προσβολής. (Παράσιτο: I) Πράσινη αφίδα (*Myzus persicae*, *Aphis* spp) με 80 γρ. σκευ. σε 50-80 λίτρα χημ. υγρού/στρέμμα. II) Δορυφόρος (*Leptogaster decemlineata*) με 40 γρ. σκευ. σε 50-80 λίτρα χημ. υγρού/στρέμμα. Ψεκάριο φύλλωματος με την εμφάνιση της προσβολής. **Φουνισκάκι:** Κόκκινο σκαθάρι των φουνισκάδων (*Rhyncophorus ferrugineus*) Olivier με 32-60 γρ. χημ. υγρού. 100 λίτρα χημ. υγρού. • Ψεκάριο κάλυψης από τη στέφανη για την προστασία των φουνισκάδων από τις προσβολές του εντόμου. • Ψεκάριο κάλυψης για προστασία της εξόχλησης της προσβολής στο κομμένο γράσο. Στο κομμένο γράσο και στο γράσο νόσο από τη βέση κοπής, κατά τη διαδικασία της κοπής. • Στο γράσο διατήρησης των εντοπίων αυτών (κύριος), σε περίπτωση που υπάρχουν υψίστα σημεία προσβολής στο γράσο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκάριο κάλυψης των φυτών (στα φυτά αυτά η φουνισκάδα εξαπλώνει μικρό ύψος και μπορεί να γίνει ψεκάριο κάλυψης). • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μεσοδιάστημα εφαρμογών (min): Ροδονκινά-Νεκταρίνα: 21/5 ημέρες. Φουνισκάκι: 2 (ανά έτος).

Γενικές Παρατηρήσεις: Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής. **Παρατηρήσεις για την αντιμετώπιση του *Rhyncophorus ferrugineus*:** Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργηθεί αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Αποφάσεως 2004 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την αγρία. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Εντοπίων. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την ανθοφορία των φουνισκάδων, σε διαφορετική περίπτωση κολλήστε τα άνθη 2 μέρες πριν την εφαρμογή. Μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτρώματος αρσών στην περιοχή εφαρμογής. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο γράσο (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυμέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυμέλες ή να απομακρυνθούν οι κυμέλες. • Για να ελέγξω με βοήθειες και σε υψίστα έντομα και σκαθάρια που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες, όπως οι δάκος, οι δάκος και οι υπεύθυνα των ανεισχυμένων που διενεργούν τους ψεκαρισμούς, υποχρεούνται να ελατοποιούν έντομα τους μελοσκοπικούς της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φουνισκάκι, με κάθε πρόφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου στεγνώσουν το ψεκατωτικό υγρό, να μην εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια (άσ στην ψεκατωτική περιοχή). Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερμονικών παγιδιών, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμόδιων τοπικών αρχών. Υπεύθυνος σε σχέση με τις απειλές όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το προϊόν.

Ειδικές συνθήκες γεωργικών, φυτογενών ή περιβαλλοντικών όρων στις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει λαμντα-cyhalothrin, που ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC. Διαχείριση αποτελεσμάτων:

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

- Εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υψίστα μέσα άσ οικονομικής ζημίας.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί καλά και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκατωτικό υγρό.

- Να αποφευχθούν οι διαδοχικές εφαρμογές με το LAMBDA STAR 2,5 WG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε evaluation με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Να διενεργείται αναπληρωτική έλεγχος των πληθυσμών των εντόμων/σκαθάρων ώστε να εντοπιστούν έντομα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανεπιθύμητων. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνουν με σκεύασμα διαφορετικής ομάδας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάριο φύλλωματος. Τρόπος παρασκευής ψεκατωτικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκατωτικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε το απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρό ποσό νερού αναδεύοντας και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκατωτικό δοχείο. Σχηματίστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι αυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Ροδονκινά, Νεκταρίνα: 7 ημέρες. Πατάτες: 15 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξεπλέμμα (τα νερά που ξεπλέμονται ρίχνονται στο ψεκατωτικό δοχείο) και στη συνέχεια αραιώνονται με τριπλό ή οχτώμο για τη διασφάλιση της μη μεταφοράς χημικής, εναντιοπίνησης σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΑΗΣ.: Βάλετε επί της συσκευασίας



FARMA - CHEM SA