

MICROFIX

Mn

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.



Το MICROFIX-Mn είναι ένα εξειδικευμένο λίπασμα για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τροφοπενιών Μαγνάνιου.

Εγγυημένη Σύνθεση: 100% υδατοδιαλυτό χηλικό Μαγγάνιο 13% EDTA

(CAS No: 15375-84-5)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

“Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί”

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πατενταρισμένη μέθοδος παρασκευής υδατοδιαλυτών μικρόκοκκων (strawbety-shaped).
- Δεν περιέχει σκόνη.
- Δεν συσσωματώνεται.
- Διαθέτει άμεση και άριστη διαλυτότητα εξαιτίας της πορώδους δομής του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Διαφυλλικές εφαρμογές: Διαφυλλικές εφαρμογές Κηπευτικά: Συνιστώνται 2-3 εφαρμογές την καλλιεργητική σεζόν σε δόση 30-60 γρ./100 λίτρα νερό. Δενδροκομικές καλλιέργειες, αμπέλι, ακτινίδιο: Συνιστώνται 2-3 εφαρμογές την καλλιεργητική σεζόν σε δόση 30-50 γρ./100 λίτρα νερό, εφόσον υπάρχει επαρκής φυλλική επιφάνεια και μετασυσλεκτικά. Σιτηρά: Συνιστώνται 1-2 εφαρμογές σε δόση 30-60γρ./100 λίτρα νερό στο αδελφωμα. Πατάτα: Συνιστώνται 1-2 εφαρμογές σε δόση 50-100 γρ./100 λίτρα νερό 21 ημέρες μετά το πλήρες φύτρωμα.

Σημείωση: Οι δόσεις για διαφυλλική εφαρμογή δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1γρ./1 λίτρο.

Υδρολίπανση: Εφαρμόζεται σε δόση 300-400 γρ./στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συνιστάται αρχική προδιάλυση με αναλογία 1 μέρος MICROFIX Mn σε 5 μέρη νερού. Στις διαφυλλικές εφαρμογές συνιστάται να συνδυάζεται με το κατάλληλο προσκολλητικό. Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε


ακραίες καιρικές συνθήκες. Συνιστώνται οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα. Συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής μετά από 3-4 ημέρες εφόσον βρέξει εντός 4 ωρών από τον ψεκασμό. Προτείνεται πριν την εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

ΣΥΝΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Διατηρείστε το pH του διαλύματος πάνω από 4.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό, μακριά από το έντονο φως. Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό).



www.farmachem.gr

Διανέμεται στην Ελλάδα από την:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ. ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr



FARMA-CHEM SA