

NUTRIFER® GII

ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Fe

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

Λίπασμα για την πρόληψη και τη διόρθωση τροφοπενιών Σιδήρου.

Σύνθεση:

Υδατοδιαλυτός Σίδηρος (Fe) 6% β/β ως χηλικός Σίδηρος Fe-EDDHA κ.β

Κλάσμα Χηλικού (EN 13366) Σιδήρου (Fe) κατ' ελάχιστον 5,7% κ.β

Χηλικός Σίδηρος (Fe) ορθο-ορθο ισομερές EDDHA: 4,0% κ.β

Σταθερό σε pH από 4 μέχρι 11 (υδατικό διάλυμα)

Το NUTRIFER GII είναι σταθερό σε pH από 4 μέχρι 11 και ιδανικό για εφαρμογές σε αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία όταν το Nutrifert Plus χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, αλλά συνιστάται να:

- ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ πριν από γεύματα και μετά την εργασία.
- ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΗΣ. ● ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ, ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ.

Φάσμα δράσης

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ): Νεαρά δέντρα: Εφαρμόστε 400γρ. - 600γρ. ανά 100m². Ωριμα δέντρα: Εφαρμόστε 150γρ. - 450γρ. ανά δέντρο. Ετήσια συντήρηση 80-120 γρ./δένδρο.

Αμπέλι (Οινοποίηση, Επιτραπέζιο, Σουλτανίνα): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 8-15 γρ. ανά πρέμνο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 15-40 γρ. ανά πρέμνο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-100 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-100 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Ελιά: Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-150 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα,

Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι): 1-5 γρ. ανά τ.μ.

Φυτώρια δέντρων: γενικά 5-8 γρ./δενδρύλιο με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση.

Καλλωπιστικά-Ανθοκομικά: Σε γλάστρες (Γαρδένια, Χρυσάνθεμα, Μπιγνόνια κ.α.) σε ήδη υγρό χώμα ρίξτε διάλυμα NUTRIFER Plus 1 γρ./κιλό νερό. Στην Ορτανσία 5 γρ./κιλό νερό. Σε βαριά προσβολή επαναλάβετε μετά από 8 ημέρες.

Σε τριανταφυλλίες: 3-5 γρ./φυτό ή 10-20 γρ./m², καθολικά.

Σε καλλωπιστικούς θάμνους: (αζαλέες, ροδόδεντρα, ορτανσίες): 16-30 γρ./θάμνο.

Για καθολική εφαρμογή: (σ'όλη την επιφάνεια) συστήνεται μια μέση δόση 5 γρ./τετρ. μέτρο εδαφικής επιφάνειας.

Υδροπονική και «λιπαντική άρδευση»

Συγκέντρωση σιδήρου 1ppm μπορεί να επιτευχθεί διαλύοντας 17 γραμμάρια NUTRIFER Plus σε 1.000 λίτρα διαλύματος (1ppm Fe = 17,86 μικρογραμμομέρια Fe ανά λίτρο).

Τρόπος-Χρόνος εφαρμογής

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στο ριζικό σύστημα την εποχή της νέας βλάστησης ή μετά το λήθαργο στα δένδρα. Στα δενδρώδη φυτά να εφαρμόζεται στο τέλος του χειμώνα. Η συνιστώμενη δόση να κατανέμεται έτσι ώστε να επωφελείται όλο το ριζικό σύστημα των φυτών. Εφαρμόζεται σκορπιστά και με ελαφρύ παράχωμα, γύρω από τον κορμό και κάτω από την έκταση της κόμης. Εφαρμόζεται και με υδρόλιπανση. Σκεπάστε το αυλάκι αμέσως και ποτίστε, μετά, κανονικά. Σε αδιαπέραστα ή δυσκολοκατέργαστα εδάφη, μπορείτε, για ευκολία, να κάνετε το ίδιο (για δέντρα και μεγάλους θάμνους) με έγχυση στο έδαφος, χρησιμοποιώντας δηλ. λαστί ή ειδικούς ενχυτήρες (2 τρύπες, τουλάχιστον, ανά τ.μ.). Οι

δόσεις εξαρτώνται από το μέγεθος και την ανάπτυξη των φυτών, την ένταση της χλωρώσεως και τη σύσταση του εδάφους. Οι μεγάλες δόσεις είναι για πολύ ανεπτυγμένα φυτά, για χλωρώσεις βαριάς μορφής και βαριά αδιαπέραστα εδάφη. Οι μικρές δόσεις για μικρά φυτά, χλωρώσεις ελαφριάς μορφής ή προληπτικές εφαρμογές και για πολύ διαπερατά εδάφη (εδάφη που απαιτούν πολλά ποτίσματα). Σε αυτά τα εδάφη συστήνεται αντί μίας εφαρμογής να γίνονται 3 ή και 4 διαδοχικές εφαρμογές μέσα στη χρονιά συνδυασμένες με τα ποτίσματα. Σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής εφαρμόστε διαλυμένο το αναγκαίο NUTRIFER Plus, ή σε αυλάκι-σε γραμμικές φυτείες-στις δύο πλευρές της κάθε γραμμής, ή σε όλη την επιφάνεια. Σκεπάστε το αμέσως με σβάρνα ή άλλο μέσο και ποτίστε. Στα αμπέλια που ξελακώνονται, εφαρμόστε το NUTRIFER Plus, στους λάκκους λίγο πριν την ισοπέδωση του αμπελώνα.

Συνδυαστικότητα

Να μην συνδυάζεται με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που περιέχουν βαριά μέταλλα. Είναι συμβατό διαλύματα που περιέχουν διαλυτά φωσφορικά άλατα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους για πληροφορίες.

Συνθήκες αποθήκευσης

Το μη χρησιμοποιημένο προϊόν φυλάσσεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εάν το διατηρείται μακριά από την έκθεση στο ηλιακό φως. Εάν το προϊόν προσλάβει υγρασία και σβολιάσει, δεν θα υπάρξει απώλεια της αποτελεσματικότητάς του. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

201812



Καθαρό Βάρος:
1 κιλό



ΠΡΟΪΟΝ: BASF

www.farmachem.gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

FARMACHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΟΔΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr

FARMACHEM SA