

NUTRIFER® Plus

ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Fe

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

Λίπασμα για την πρόληψη και τη διόρθωση τροφοτενιών Σιδήρου.

Σύνθεση:

Υδατοδιαλυτός Σίδηρος (Fe) 6% β/β ως χηλικός Σίδηρος Fe-EDDHA κ.β

Κλάσμα Χηλικού (ΕΝ 13366) Σιδήρου (Fe) κατ' ελάχιστον 5,7% κ.β

Χηλικός Σίδηρος (Fe) ορθο-ορθο ισομερές EDDHA: 4,8% κ.β

Σταθερό σε pH από 4 μέχρι 11 (υδατικό διάλυμα)

Το NUTRIFER Plus είναι ένα ιδανικής καθαρότητας λίπασμα χηλικού Σιδήρου σε μορφή μικρόκοκκων.

Η υψηλότατη συγκέντρωση του ορθο-ορθο ισομερούς, στο χηλικό παράγοντα EDDHA, καθιστά το σκεύασμα σταθερό σε pH από 4 μέχρι 11 και ιδανικό για εφαρμογές σε αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία όταν το Nutrif Plus χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, αλλά συνιστάται να: • ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ πριν από γεύματα και μετά την εργασία. • ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΧΡΗΣΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΗΣ. • ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ, ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΤΡΟΦΕΣ.

Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι): 1-5 γρ. ανά τ.μ.

Φυτώρια δεντρών: γενικά 5-8 γρ./δενδρύλιο με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση.

Καλλωπιστικά-Ανθοκομικά: Για χλαρτές (Γαρδενά, Χρυσάνθεμα, Μπιγνόνια κ.α.) σε ήδη υγρό χώμα ρίζες διάλυμα NUTRIFER Plus 1 γρ./κιλό νερό. Στην Ορταναία 5 γρ./κιλό νερό. Σε βαριά προσβολή επαναλάβετε μετά από 8 ημέρες.

Σε τριανταφυλλίες: 3-5 γρ./φυτό ή 10-20 γρ./m², καθολικά.

Σε καλλωπιστικούς θάμνους: (αζαλέες, ροδδοντρά, ορτανσίες): 16-30 γρ./θάμνο.

Για καθολική εφαρμογή: (σ' όλη την επιφάνεια) συστήνεται μια μέση δόση 5 γρ./τετρ. μέτρο εδαφικής επιφάνειας.

Υδροπονική και λιπαντική άρδευση

Συγκέντρωση σιδήρου 1ppm μπορεί να επιτευχθεί διαλύνοντας 17 γραμμάρια NUTRIFER Plus σε 1.000 λίτρα διαλύματος (1ppm Fe = 17,86 μικρογραμμούρια Fe ανά λίτρο).

Τρόπος-Χρόνος εφαρμογής

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στο ριζικό σύστημα την εποχή τη νέας βλάστησης ή μετά το λήθαργο στα δένδρα. Στα δενδρώδη φυτά να εφαρμόζεται στο τέλος του χειμώνα. Η συνιστώνεται δόση να κατανέμεται έτσι ώστε να επιφέρεται όλο το ριζικό σύστημα των φυτών.

Εφαρμόζεται σκορπιστά και με ελαφρύ παράχωμα, γύρω από τον κορμό και κάτω από την έκταση της κόμης. Εφαρμόζεται και με υδρολίπανση. Σκεπάστε το αυλακιά μέσως και ποτίστε, μετά, κανονικά. Σε αδιάπερστα ή δυσκολοκατέργαστα εδάφη, μπορείτε, για ευκολία, να κάνετε το ίδιο (για δέντρα και μεγάλους θάμνους) με έγχυση στο έδαφος, χρησιμοποιώντας δηλ. λοστό ή ειδικούς εγχυτήρες (2 τρύπες, τουλάχιστον, ανά τ.μ.). Οι

δόσεις εξαρτώνται από το μέγεθος και την ανάπτυξη των φυτών, την ένταση της χλώρωσης και τη σύσταση του εδάφους. Οι μεγάλες δόσεις είναι για πολύ ανεπιγυμένα φυτά, για χλωρώσεις βαριάς μορφής και βαριά αδιστέραστα εδάφη. Οι μικρές δόσεις για μικρά φυτά, χλωρώσεις ελαφριάς μορφής ή προληπτικές εφαρμογές και για πολύ διαπερατά εδάφη (εδάφη που απαιτούν πολλά ποτισμάτα). Σε αυτά τα εδάφη συστήνεται αντί μίας εφαρμογής να γίνονται 3 ή και 4 διαδοχικές εφαρμογές μέσα στη χρονιά συνδυασμένες με τα ποτισμάτα. Σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής εφαρμόζεται διαλυμένο το αναγκαίο NUTRIFER Plus, ή σε αυλάκι-σε γραμμικές φυτείες-στις δύο πλευρές της καδέ γραμμής, ή σε όλη την επιφάνεια. Σκεπάστε το αυλάκι με βάρια σάντα και ποτίστε. Στα αμπέλια που εγκαύνιωνται, εφαρμόστε το NUTRIFER Plus, στους λάκκους λίγο πριν την ισοπέδωση του αμπελώνα.

Συνδυαστικότητα

Να μην συνδυάζεται με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που περιέχουν βαριά μέταλλα. Είναι αυματόδιαλύματα που περιέχουν διαλυτά φωσφορικά άλατα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλεύετε τον προμηθευτή σας. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους για πληροφορίες

Συνθήκες αποθήκευσης

Το μηχανισμοποιημένο προϊόν φυλάσσεται για απεριόριτο χρονικό διάστημα, εάν το διατηρείται μακριά από την έκθεση στο ηλιακό φως. Εάν το προϊόν προσλαβεί υγρασία και σβολίσει, δεν θα υπάρξει απώλεια της αποτελεσματικότητάς του. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώνεται δόσοσηλογίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. Διατηρήστε το σε μέρος έρπο και δροσερό.

Φάσμα δράσης

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ): Νεαρά δέντρα: Εφαρμόστε 400γρ. - 600γρ. ανά 100m². Ήδη μέτρα: Εφαρμόστε 150γρ. - 450γρ. ανά δέντρο. Ετήσια συντήρηση 80-120 γρ./δένδρο.


Αμπέλι (Οινοποιίσμα, Επιπραπέζιο, Σουλτανίνα): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 8-15 γρ. ανά πρέμνο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 15-40 γρ. ανά πρέμνο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-100 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Πυρηνώκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταριά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκά): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-100 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Ελιά: Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-150 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα,



Καθαρό Βάρος:
1 κιλό

ΠΡΟΪΟΝ: BASF



www.farmachem.gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑ:

FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Ο.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗλ.: 2310 569.630 ώρα 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr

FARMA-CHEM SA