



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33

FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr

www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

NUTRIFER Plus

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΑ

Λίπασμα για την πρόληψη και τη διόρθωση τροφοπενιών Σιδήρου.

✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Υδατοδιαλυτός Σίδηρος (Fe) 6% β/β ως χηλικός Σίδηρος Fe-EDDHA κ.β

Κλάσμα Χηλικού (EN 13366) Σιδήρου (Fe) κατ' ελάχιστον 5,7 κ.β

Χηλικός Σίδηρος (Fe) ορθο-ορθο ισομερές EDDHA: 4,8% κ.β

Σταθερό σε pH από 4 μέχρι 11 (υδατικό διάλυμα)

Διανομέας: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ): Νεαρά δέντρα. Εφαρμόστε 400γρ-600γρ ανά 100 m². Ωριμα δέντρα: Εφαρμόστε 150γρ-450γρ ανά δέντρο. Ετήσια συντήρηση 80-120γρ./δένδρο.

Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο, Σουλτανίνα): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 8-15 γρ. ανά πρέμνο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 15-40 γρ. ανά πρέμνο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-100 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά): Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-100 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Ελιά: Προληπτική εφαρμογή. Δόση 30-50 γρ. ανά δένδρο. Θεραπευτική εφαρμογή. Δόση 50-150 γρ. ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων.

Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι): 1-5 γρ. ανά τ.μ.

Φυτώρια δέντρων: γενικά 5-8 γρ./δενδρύλιο με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση.

Καλλωπιστικά-Ανθοκομικά: Σε γλάστρες (Γαρδένια, Χρυσάνθεμα, Μπιγόνια κ.α.) σε ήδη υγρό χώμα ρίξτε διάλυμα **NUTRIFER Plus** 1 γρ./κιλό νερό. Στην Ορτανσία 5 γρ./κιλό νερό. Σε βαριά προσβολή επαναλάβετε μετά από 8 ημέρες.

Σε τριανταφυλλιές: 3-5 γρ./φυτό ή 10-20 γρ./m², καθολικά.

Σε καλλωπιστικούς θάμνους: (αζαλέες, ροδόδεντρα, ορτανσίες): 16-30 γρ./θάμνο.

Για καθολική εφαρμογή: (σ'όλη την επιφάνεια) συστήνεται μια μέση δόση 5 γρ./τετρ. μέτρο εδαφικής επιφάνειας.

Υδροπονική και λιπαντική άρδευση:

Συγκέντρωση Σιδήρου 1ppm μπορεί να επιτευχθεί διαλύοντας 17 γραμμάρια NUTRIFER Plus σε 1000 λίτρα διαλύματος (1ppm Fe = 17.86 μικρογραμμομόρια Fe ανά λίτρο).

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Να μην συνδυάζεται με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που περιέχουν βαριά μέταλλα. Είναι συμβατό με διαλύματα που περιέχουν διαλυτά φωσφορικά άλατα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους για πληροφορίες

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

pH: 8-9 (10g/l)

Ειδικό βάρος: 1,59

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Το NUTRIFER Plus είναι ένα ιδανικής καθαρότητας λίπασμα χηλικού Σιδήρου σε μορφή μικρόκοκκων. Η υψηλότερη συγκέντρωση του ορθο-ορθο ισομερούς, στο χηλικό παράγοντα EDDHA, καθιστά το σκεύασμα σταθερό σε pH από 4 μέχρι 11 και ιδανικό για εφαρμογές σε αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το μη χρησιμοποιούμενο προϊόν φυλάσσεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εάν το διατηρείται μακριά από την έκθεση στο ηλιακό φως. Εάν το προϊόν προσλάβει υγρασία και σβολιάσει, δεν θα υπάρξει απώλεια της αποτελεσματικότητάς του. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Μην υπερβαίνονται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

- *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** *Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.*