

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Χειμερινό Σιτηρό (Κριθάρι, Σιτάρι, Τριτάκι): Για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: 2 γρ./στρ. σε 10-50 λίτρα φεκ. υγρού στο στρέμμα. Μεταμετεωρική εφαρμογή μετά τα 9 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι το τέλος του αδελφώματος. **Παρατηρήσεις:** 1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο των 2 έως 6 φύλλων. **Καταπολεμώμενα ζιζάνια:** Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριο ανόπλι (Sisymbrium officinalis), Άγριο χαμομήλι (Anthemis anemoides), Κοιμήλλα (Cirsium bursa-pastoris), Λάιμο (Lamium purpureum), Στελλάρια (Stellaria media), Ευαίσθητα ζιζάνια: Κίρσο (Cirsium anemoides), Κοιμήλλα (Cirsium bursa-pastoris), Λάιμο (Lamium purpureum), Στελλάρια (Stellaria media), Ευαίσθητα ζιζάνια: Κίρσο (Cirsium anemoides), Κοιμήλλα (Cirsium bursa-pastoris), Λάιμο (Lamium purpureum), Στελλάρια (Stellaria media). **Μόνοτος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 εφαρμογή. **Τελειώσιμη επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Σιτηρά: Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή. **Τρόπος εφαρμογής:** Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με μικτό τύπου σκόνης με πίεση μακρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και υπό συνεχή ανάδευση με τα συνεχή ψεκαστικά εδάφους και με 10-50 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Προετοιμάστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής: - Αδειάστε τελείως το βυτίο. - Ξεπνεύστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (ενέλιξη, ψεκαστικό αέριο) και αδειάστε το ξανά. - Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε διάλυμα 1/3 λίτρο οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητα 9,5%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό. - Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως. - Για να ασφαλιστεί όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό. - Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα. - Το ψεκαστικό να μην ξεπλύνεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί. **Φυτοτοξικότητα:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτολογικές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απορριφθεί:** Να εφαρμόζονται ενυδακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ταξινόμηση κατά HRAC: Group B. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας (κουτιά, σακιά), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόνη ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εγκαταβάλλονται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Τα κενά βάζα ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, τελικά εγκαταβάλλονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:** Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες < 35°C παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και απορής ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτηρά, λινάρι, τριφύλλι, ελακράμβη, κουκά, μπαζέλια, πατάτες πριν περάσουν 90 μέρες από την εφαρμογή του. Σε περίπτωση απιστίας, να σπέρνετε μόνο σιτηρά τον ίδιο χρόνο. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (6 ώρες)

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταμετεωρικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι). Δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακροία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθέσεως του οξυγαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.

Προφυλάξεις: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις αεριογόνων, αεραερίων. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα μέσα σε οποιαδήποτε προσπάθεια για τα μάτια πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την αντιμετώπιση ρύπανσης και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια. EUH 401: Για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και η επιβλάβεια της ανθρώπινης υγείας και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποσώμενα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών: 210 - 7793777. **PS01:** Διάθεση του περιεχομένου, περίσσεια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Spt: Μην ρυπνίζετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Spt1: Για να προστατέψετε το υπόγειο νερό μην χρησιμοποιείτε το TRAILER σε ολική εδάφη (pH>7) περισσότερο από μία φορά κάθε 3 χρόνια για ετήσιες εφαρμογές σε χειμερινό σιτηρά. Spt3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη απόσπασης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Spt3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αεικήση ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.



ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πάλο τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Περιέχει tribenuron-methyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 100 ΓΡ

TRAILER®

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Tribenuron-methyl 75% β/β - Βοηθητικές ουσίες 21,8% β/β

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ)

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70192 / 14-12-2016
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.



Κάτοχος της έγκρισης: INDUSTRIAS AFRASA S.A.
Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad de Sevilla, 53,
E-46968 Paterna Valencia, Ισπανία - www.afrasa.es



FARMA-CHEM SA



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
FARMA-CHEM SA

ΒΙΛΕ ΣΙΝΔΟΥ - Γ ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026 - 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 569.630 έως 3 - **FAX:** 2310 797.047
info@famachem.gr - www.famachem.gr