



Προέλευση Αυστραλία:

agrichem®

amino-feed N

Κυκλοφορεί ως βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών για χρήση στην γεωργία σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35).

Οργανικό μίγμα αμινοξέων φυτικής προέλευσης προερχόμενο από ενζυματική υδρόλυση.

Εγγυημένη Σύνθεση

Ανάλυση	% (β/α)	% (β/β)
Συνολικά αμινοξέα	40.0	34.0

Ενισχυτικό ανάπτυξης φυτών
(Σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004)



FARMA-CHEM SA

Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα:
FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ - Γ' ΖΩΝΗ - Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 3 - FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr - www.farmachem.gr

Προφυλάξεις: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Ειδικό βάρος: 1,13-1,17. pH: 4,0-6,5.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το **AMINOFEED N** παράγεται μέσω ενζυματικής υδρόλυσης με τη χρήση συγκεκριμένου τύπου βακτηρίων. Αποτελεί μία συμπυκνωμένη πηγή αμινοξέων, με υψηλότερη συγκέντρωση σε L-αμινοξέα, που επιταχύνει το μεταβολισμό και την πρωτεϊνοσύνθεση. Απορροφάται άμεσα τόσο από το φύλλωμα όσο και από τη ρίζα και:

- Μεγιστοποιεί τον μεταβολισμό των φυτών για παραγωγή καρπών μεγαλύτερου μεγέθους και την παραγωγή περισσότερης βιομάζας.
- Ενισχύει τη βλαστικότητα της γύρης για καλύτερη καρπώδεση.
- Ενισχύει την αντοχή των φυτών στο περιβαλλοντικό στρες.
- Ισχυροποιεί την φωτοσυνθετική ικανότητα.
- Ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων τόσο από το φύλλωμα όσο και από τη ρίζα.
- Βελτώνει την ωφέλιμη μικροχλωρίδα του εδάφους.
- Είναι ιδανικό για το γκαζόν.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δομασκηλιά, Βερικοκιά): Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη της άνθησης, στην καρπώδεση και κατά την αύξηση του καρπού. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέιφ φρουτ, Λεμόνι):** Συνιστώνται ψεκασμοί, στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης, στην πτώση των πετάλων, στο γέμισμα του καρπού το καλοκαίρι και 4-6 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Επιτραπέζια, Οικοποιήσιμο σταφύλι:** Συνιστώνται ψεκασμοί στα 10 εκ. της νέας βλάστησης, πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρπώδεσης στο κλείσιμο της σταφυλής και στην έναρξη του γυαλισματος. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακτινίδιο:** Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρπώδεσης και 3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ελιά:** Συνιστώνται ψεκασμοί στη νέα βλάστηση, στην καρπώδεση και στην σκλήρυνση του πυρήνα. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φυστικά, Φουντουκιά):** Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη της άνθησης και στην καρπώδεση. Δόση: 200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Κηπευτικά-Λαχανοκομικές:** Συνιστώνται ψεκασμοί σε κρίσιμα καλλιεργητικά στάδια και σε συνθήκες στρες σε δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.



Βομβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στα 3-4 φύλλα και ο δεύτερος στα πρώτα χτένια. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Μηδική:** Συνιστάται ένας ψεκασμός μετά από κάθε μαχαίρι. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Σιτάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι:** Συνιστάται ένας ψεκασμός στο τέλος του αδελφώματος και πριν την εμφάνιση της σημιάς. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Χλοσάπτης:** 200-400 κ.εκ./στρ. **Θερμοκηπιακές καλλιέργειες:** Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Υδρολίπανση:** Εφαρμόζεται σε δόση 1-2 λίτρα/στρ. στα αντίστοιχα στάδια εφαρμογής των διαφυλλικών ψεκασμών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Να μην συνδυάζεται με παραφινικό λάδι. Να μη συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα πλην της ελιάς. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές συνδυαστικότητας με μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνεται τις συστασμένες δόσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό).

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ/ΗΜ ΛΗΞ.: Βλέπε επί της συσκευασίας



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1lt / 1,15kg