



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33

FAX: 2310 797.047

info@farmachem.gr

www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

POWER-14 P Ca

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΑ

Ειδικό σκεύασμα θρέψης Φωσφόρου – Ασβεστίου.

✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ %	w/w	w/v
Άζωτο (N)	3	4,05
Αμμωνιακό (N)	2	2,7
Νιτρικό (N)	1	1,35
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	22	29,7
Ασβέστιο (CaO)	5,2	7,02

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

✓ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ομάδα Α: Ανόργανο λίπασμα κύριων και δευτερευόντων στοιχείων με ή χωρίς ιχνοστοιχεία.

✓ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

pH (1:100): 2,2

Ειδικό βάρος: 1,35

✓ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Γκρέϊπ φρουτ): Γίνονται εφαρμογές α) πριν την άνθηση, β) στο στάδιο της καρπόδεσης ανά 10-14 ημέρες και γ) πριν την ωρίμανση. Δόση: 200-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** Για συνεκτική σάρκα: Γίνονται 3-4 ψεκασμοί που ξεκινούν από την πτώση των πετάλων, ανά 10-14 ημέρες. Για καλύτερο κόκκινο χρωματισμό: Γίνεται εφαρμογή στην αλλαγή του χρώματος των καρπών και επανάληψη σε 7 ημέρες, συνήθως 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Σε αυτήν την περίπτωση να εφαρμόζεται μόνο του. Δόση: 200-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά):** Για συνεκτική σάρκα: Γίνονται 2-3 ψεκασμοί που ξεκινούν 3-7 ημέρες από την πτώση των πετάλων, ανά 10-14 ημέρες. Για καλύτερο κόκκινο χρωματισμό: Γίνεται εφαρμογή στην αλλαγή του χρώματος των καρπών και επανάληψη σε 7 ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση να εφαρμόζεται μόνο του. Δόση: 200-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο, Σουλτανίνα, Σταφίδα):** Γίνονται εφαρμογές: α) πριν την άνθηση, β) στην καρπόδεση, γ) όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού και δ) στην έναρξη του γυαλίσματος των καρπών. Δόση: 300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ακτινίδια:** Γίνονται 2-3 εφαρμογές, ξεκινώντας 5 ημέρες από την πτώση των πετάλων, 15-20 ημέρες μετά την πτώση των πετάλων και μετά ανά 10-14 ημέρες. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Φράουλα:** Γίνονται 3-4 εφαρμογές συνολικά, από την έναρξη της άνθησης και μετά, κατά την αύξηση του καρπού. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Ελιά:** Γίνονται εφαρμογές α) πριν το κρόκισμα, β) στην καρπόδεση μέχρι και τη σκλήρυνση του πυρήνα. Στις ελιές Καλαμών εφαρμόζεται και 15-20 ημέρες πριν τη συγκομιδή για καλύτερο μαύρισμα. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Τομάτα (υπαίθρια-βιομηχανική), Πιπεριά, Μελιτζάνα:** Γίνονται 2-4 εφαρμογές, ξεκινώντας από κάθε καρπόδεση και επανάληψη ανά 10 ημέρες στην αύξηση του καρπού. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι:** Γίνονται 2-4 εφαρμογές, α) ξεκινώντας από τα πρώτα λουλούδια, β) στην καρπόδεση και επανάληψη ανά 10 ημέρες στην αύξηση του καρπού. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Πατάτα:** Για την αύξηση του αριθμού των κονδύλων: Συστήνονται δύο ψεκασμοί, ο πρώτος όταν οι ακραίες διογκώσεις, έχουν διπλάσια διάμετρο από τον υπόλοιπο στόλωνα, κατά την έναρξη της κονδυλοποίησης και ο δεύτερος μετά από 10 ημέρες. Για την αύξηση του μεγέθους των κονδύλων: Συστήνονται δύο ψεκασμοί, ανά 15 ημέρες, κατά το γέμισμα του κονδύλου. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Φασόλι, Καρότο:** Γίνονται 2-3 εφαρμογές ξεκινώντας όταν τα φυτά αποκτήσουν 15 εκ. ύψος και μετά, ανά 14 ημέρες. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Κρεμμύδι, Σκόρδο:** Γίνονται 1-2 εφαρμογές ξεκινώντας από τον σχηματισμό του βολβού και μετά, ανά 14 ημέρες. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Βαμβάκι:** Γίνονται 2 εφαρμογές ξεκινώντας όταν τα φυτά αποκτήσουν αποκτήσουν τα πρώτα χτένια και 15 ημέρες αργότερα. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. **Θερμοκηπιακές καλλιέργειες:** Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα/στρ. **Υδρολίπανση:** Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση 1-2 λίτρα/στρ.

✓ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Το **POWER 14 P-Ca** είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν θρέψης που εφαρμόζεται για τη βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγής και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων κατά την αποθήκευση. Περιορίζει το σχίσμο των καρπών, τις καρποπτώσεις, ενισχύει τη συνεκτικότητα των καρπών και τον κόκκινο χρωματισμό στα μήλα. Αυξάνει επίσης την κονδυλοποίηση και το μέγεθος των κονδύλων στην πατάτα.

✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.