



FARMA-CHEM SA

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ' ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026



570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33



FAX: 2310 797.047



info@farmachem.gr



www.farmachem.gr



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

NOVASTIM

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Το NOVASTIM™ είναι ένα υπερκείμενο που προκύπτει από τη ζύμωση του *Bacillus subtilis* LBS2. συμπυκνώνεται και καθαρίζεται. Ο *Bacillus subtilis* είναι ένας οργανισμός γνωστός για τις ενισχυτικές του ιδιότητες.

Το NOVASTIM™ δεν περιέχει ζωντανούς οργανισμούς. Ο τρόπος δράσης του οφείλεται στις συνέργειες ενός μοναδικού συνδυασμού πρωτογενών και δευτερογενών μεταβολιτών από τη βελτιστοποιημένη ζύμωση επιλεγμένων στελεχών του *Bacillus subtilis*.

Με την εφαρμογή NOVASTIM™ οι μεταβολίτες ενσωματώνονται απευθείας στο φυτό, σε τέλεια ισορροπία, βελτιστοποιώντας την απόδοση των θρεπτικών συστατικών, αυξάνοντας έτσι τη συγκομιδή.



ΣΥΣΤΑΣΗ:

Περιέχει: 83,3% υπερκείμενο *Bacillus subtilis* LBS2.

Ενισχυτικό ανάπτυξης φυτών σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004.

Προϊόν: ELEPHANT VERT FRANCE

Παρασκευαστής: LIPOFABRIK S.A.S

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

✓ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες λαχανικών (τομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια): Δόση: 100 ml/100 L. 1 εφαρμογή φυλλώματος 7 έως 10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση για εξουδετέρωση του στρες. 1 εφαρμογή στην ανθοφορία και 1 εφαρμογή στην καρπώδεση για βελτίωση της απόδοσης. 1 εφαρμογή κατά την αλλαγή χρώματος για αύξηση μεγέθους και βελτίωση ποιότητας. **Καλλιέργειες λαχανικών και φυλλώδη λαχανικά υπαίθρου:** Δόση: 100 ml/100 L. 1 εφαρμογή φυλλώματος 7 έως 10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση για εξουδετέρωση του στρες. Για ποικιλίες μεγάλου κύκλου, εφαρμόστε ξανά 10 έως 15 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής. **Τροπικές καλλιέργειες, Οπωροκηπευτικές καλλιέργειες, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Μούρα, Αμπέλι:** Δόση: 100 ml/100 L. 1 εφαρμογή στην αρχή της ανθοφορίας. Για να βελτιωθεί η ποιότητα της συγκομιδής: 2 εφαρμογές (η 1^η στην αρχή της σοδειάς και η 2^η 15-20 ημέρες μετά). **Μεγάλη καλλιέργεια, σιτηρά:** Δόση: 100 ml/στρέμμα. 2 εφαρμογές μισού κύκλου, που συνδυάζονται με την εφαρμογή άλλων προϊόντων. Μεσοδιάστημα 2 έως 3 εβδομάδων. **Κήπος, χώροι πρασίνου, υποδομές, δάσος:** Δόση: 100 ml/100 L. Εφαρμόστε 5 έως 7 ημέρες πριν από μια πιθανή περίοδο στρες (κύμα καύσωνα, ξηρασία, έντονες βροχοπτώσεις κτλ). **Φυτώρια κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών:** Δόση: 100 ml/100 L. 1-2 διαφυλλικές εφαρμογές σε δίσκους, πριν τη μεταφύτευση. **Αρωματικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά:** Δόση: 100 ml/100 L. 1 εφαρμογή φυλλώματος 7 έως 10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση για εξουδετέρωση του στρες. 1 εφαρμογή στη μέση του κύκλου ή μετά την κοπή.

✓ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το NOVASTIM™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, για τις δόσεις εφαρμογής ανατρέξτε στον πίνακα χρήσεων. Για εφαρμογή μικρότερη από 0,1% συνιστάται ο συνδυασμός του NOVASTIM™ με ένα βοηθητικό. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή του NOVASTIM™ κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά προτίμηση μια εφαρμογή το πρωί ή στο τέλος της ημέρας.

Πριν εφαρμόσετε το NOVASTIM™ αναμειγμένο με άλλα προϊόντα στη δεξαμενή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή/και τον διανομέα του NOVASTIM™.

✓ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και πολύ καλά αεριζόμενο μέρος. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, που δεν υπερβαίνει τους 30°C. Μην αφήνετε το προϊόν να χυθεί στο περιβάλλον.

- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.